



Neurocirugía



<https://www.revistaneurocirugia.com>

P0315 - QUISTE DE LA BOLSA DE RATHKE. PRESENTACIÓN DE NUESTRA SERIE QUIRÚRGICA 2010-2017

M.P. Garrido García, T. Cao Cardero, D. García Sánchez, A. Roca Barber, A.R. Quiroz Tejada, J.A. Simal Julián y C. Botella Asunción

Hospital La Fe, Valencia, España.

Resumen

Objetivos: Descripción de nuestra serie de casos quirúrgicos en relación a los quistes de la bolsa de Rathke.

Métodos: Análisis retrospectivo entre 2010-2017.

Resultados: Se encontraron 43 casos, de entre los cuales se realizaron 12 intervenciones en 9 pacientes (21%). 5 mujeres, 4 hombres. Edad media 41 años. Tamaño medio del quiste 17.3 mm (7-28 mm). Clínica de debut: 1 alteración hormonal pura, 6 alteraciones visuales puras y 2 alteraciones mixtas. 3 pacientes necesitaron reintervención por recidiva. 9 abordajes endonasaes (8 transesfenoidales y 1 transplanum, transtubérculo) y 3 abordajes transcraneales (subfrontales). En cuanto a la localización se encontraron: 1 selar puro, 1 supraselar puro, 7 selares-supraselares. 100% de mejoría visual y hormonal tras cirugía. Ningún caso de fístula de LCR.

Conclusiones: Los quistes de la bolsa de Rathke son una patología usualmente indolente y son diagnosticados como hallazgo casual, sin embargo, en caso de sintomatología visual o alteración hormonal asociada, la cirugía, seleccionando la vía de abordaje según la localización del quiste, es la indicación segura y eficaz para el control de los síntomas.