

<https://www.revistaneurocirugia.com>

C0504 - VARIANTES ANATÓMICAS DEL NERVIO MEDIANO A NIVEL DEL TÚNEL DEL CARPO: RAMA MOTORA TENAR QUE ATRAVIESA EL LIGAMENTO TRANSVERSO DEL CARPO

J. Robla Costales, R. Uriel Lavín, R. Diana Martín, G. Mattos Piaggio, J. Ibáñez Plágaro y E. Quevedo Orrego

Complejo Asistencial Universitario de León, León, España.

Resumen

Objetivos: Los nervios periféricos son estudiados según sus patrones anatómicos más frecuentes, pero la realidad es que pueden existir variantes anatómicas hasta en el 20-30% de la población general. El conocimiento de las posibles variantes anatómicas nos permite anticipar su hallazgo intraoperatorio y evitar lesiones iatrogénicas.

Métodos: Paciente de 39 años de edad con clínica de síndrome del túnel carpiano, consistente en dolor y parestesias en territorio mediano en la mano izquierda. La clínica no respondió a tratamiento conservador, por lo que se decidió su intervención quirúrgica previo estudio electromiográfico que confirmó la existencia de un síndrome del túnel carpiano de carácter moderado.

Resultados: A través de una incisión de 2,5 cm en la palma de la mano se realiza la sección progresiva y cuidadosa del ligamento transverso del carpo para descomprimir el nervio mediano. En el espesor del ligamento transverso del carpo se identifica el ramo motor tenar del nervio mediano, el cual pasa a través del ligamento hasta dirigirse a la musculatura tenar.

Conclusiones: Las variantes anatómicas no son infrecuentes en los nervios periféricos, y su existencia debe ser tomada en cuenta a la hora del abordaje al nervio. La realización de la sección del carpo debe realizarse de forma cuidadosa para evitar la lesión iatrogénica nerviosa. Durante la realización de procedimientos endoscópicos para la descompresión del túnel carpiano pueden pasar inadvertidas estas variaciones anatómicas y existe un riesgo mayor de lesión nerviosa.